

Un numéro utile : **Hépatites Info Service**  
**0 800 845 800**

(N° Vert : appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe)

L'hépatite C sur Internet :

**www.sante.gouv.fr**

Rubrique «les dossiers», sélectionner «Hépatite C»

**www.soshepatites.org**

Adresses des centres de dépistage  
anonyme et gratuit :

**www.hepatites-info-service.org**

# Hépatite

**Mémo** à l'usage des médecins



# Dépistage de l'hépatite C

## Aborder le problème de l'hépatite C avec vos patients : les nouveaux mais également avec les anciens et notamment à l'occasion d'une grossesse

### Antécédents d'actes médicaux ou comportements à risque élevé d'infection à VHC

#### De nombreux actes médicaux ou comportements sont à risque élevé d'infection VHC

**Avant 1990 :** administration de fractions coagulantes dérivées du sang (facteurs anti-hémophiliques, PPSB, Willebrand, fibrinogène, plasma sec, cryoprécipités, anti-thrombine III).

**Avant 1992 :** transfusion de sang, «culots» globulaires, concentrés plaquettaires, plasma, greffe de tissu, cellules, organes.

**Avant 1997 :** exposition nosocomiale lors d'actes invasifs (par exemple : endoscopie avec biopsie...), compte tenu des risques résiduels encore incomplètement maîtrisés.

**Quelle que soit la date :** hémodialyse.

#### Quelle que soit la date :

- ▶ partage ou mise en commun du matériel utilisé pour la préparation et l'injection (seringue, cuillère, eau, coton, citron) d'héroïne, de cocaïne ou de médicaments détournés ;
- ▶ partage de paille pour la prise de drogue par voie nasale.

**Quelle que soit la date :** transmission materno-fœtale.

### À quels patients proposer systématiquement un test de dépistage de l'hépatite C ?

#### À toute personne qui a reçu ou eu avant 1992 :

- ▶ une intervention chirurgicale lourde (cardiaque, vasculaire, cérébrale, digestive, pulmonaire, gynéco-obstétricale, rachidienne, prothèse de hanche ou genou...)
- ▶ un séjour en réanimation ;
- ▶ un accouchement difficile ;
- ▶ une hémorragie digestive ;
- ▶ des soins à la naissance en néonatalogie ou en pédiatrie (grand prématuré, pathologie néonatale grave, exsanguino-transfusion) ;
- ▶ une greffe de tissu, cellules ou organes ;
- ▶ et, bien entendu, une transfusion.

#### Aux patients hémodialysés.

#### À toute personne ayant utilisé même une fois dans sa vie, même s'il y a longtemps, une drogue par voie intraveineuse ou pernasale.

#### Aux enfants nés de mère ayant une hépatite chronique C (ARN VHC positif).

### Il faut également tenir compte d'autres situations

Des actes avec effraction cutanée, le partage d'objets pouvant être souillés par du sang peuvent comporter un risque de transmission du VHC.

Il faut donc proposer un dépistage, même si ce risque n'est pas, actuellement, totalement mesuré :

- ▶ aux partenaires sexuels des personnes atteintes d'hépatite chronique C ;
- ▶ aux membres de l'entourage familial des personnes atteintes d'hépatite chronique C ;
- ▶ aux personnes incarcérées ou ayant été incarcérées (risque de partage d'objets coupants ou de pratiques addictives) ;
- ▶ aux personnes ayant eu un tatouage ou un piercing, sans utilisation de matériel à usage unique ou personnel ;
- ▶ aux personnes ayant reçu des soins dans des pays à forte prévalence du VHC (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud).

### Pensez à proposer un test de dépistage aux patients dans certaines situations cliniques :

- présentant une élévation même minime (supérieure à la valeur normale en fonction du sexe), du dosage des transaminases ALAT/SGPT,
- découverts séropositifs pour le VIH ou porteurs de l'antigène HBS positif,
- présentant une asthénie importante prolongée et inexpliquée,
- et devant un antécédent d'ictère non expliqué.